

## 【ABI・PWV検査を受けられる方へ】

### ■ 検査の概要

ABI検査（足関節上腕血圧比）は足首と上腕の血圧の比率のことです。

「足の動脈の詰まり具合」の目安になります。

PWV検査（脈波伝播速度）は、心臓の拍動が動脈に通じて手や足に届く速度のことです、「血管の硬さ」の指標になります。

一度の検査でABIとPWVを同時に測定し、脳梗塞や心筋梗塞の原因となる動脈硬化の程度を調べることができます。

検査時間は15分程度です。



### ■ 検査方法

□ ベットに仰向けになり、両側の腕と足首に血圧計のカフ、両側手首に心電計の電極、胸に心音マイクを装着し、四肢の血圧を同時に測定します。

### ■ 検査前のご注意

□ 上腕と足首が出しやすい服装でお越しください。

□ ストッキング、厚手や締め付けのきつい衣類は脱いでいただきます。

□ 食事や水分の影響は、こちらの検査にはありません。

### ■ 下記の方は事前にお知らせください

【禁忌】検査できません。

□ 下肢の深部静脈血栓症の方

□ 動脈瘤のある方

【要相談】片側のみの検査になります。

□ 透析シャントのある方

□ 乳房手術後の方

□ その他、血圧測定ができない部位のある方

その他、ご不明な点がございましたら遠慮なくご相談ください。